

**AFSPRAKEN VOOR OPERATIES  
BIJ PATIËNTEN MET DIABETES  
(SUIKERZIEKTE)**

---

U wordt binnenkort geopereerd. Aangezien u diabetes (suikerziekte) heeft, vindt u hieronder belangrijke informatie.

□ Als u bloedsuikerverlagende tabletten inneemt:

▪ **2 dagen voor de operatie stopt u met de volgende tabletten als u dit gebruikt:**

- Canagliflozine
  - Empagliflozine
  - Dapagliflozine
  - Ertugliflozine
- De avond voor de operatie kunt u wel eten en kunt u wel uw bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken, behalve Liraglutide.
- De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen. Lees hiervoor de folder 'voorbereiding op uw operatie' goed door.
- De ochtend van de operatie mag u geen bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken.
- Bij een hypo-gevoel mag u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

□ Als u insuline spuit

- De avond voor de operatie kunt u wel eten en kunt u wel insuline gebruiken.
- De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen. Lees hiervoor de folder 'voorbereiding op uw operatie' goed door.
- Als u 's ochtends langwerkende insuline gebruikt (zoals Lantus, Levemir, Insulatard, Humuline NPH of Insuman Basal), dan moet u  $\frac{3}{4}$  van uw eigen dosering spuiten.
- Als u 's ochtends kortwerkende insuline of een mix-insuline gebruikt, dan mag u geen insuline spuiten.
- Bij een hypo-gevoel mag u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

- ❑ Als u bloedsuikerverlagende tabletten gebruikt én insuline spuit:
  - **2 dagen voor de operatie stopt u met de volgende tabletten als u dit gebruikt:**
    - Canagliflozine
    - Empagliflozine
    - Dapagliflozine
    - Ertugliflozine
  - De avond voor de operatie kunt u wel eten en wel insuline spuiten en wel uw bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken, behalve Liraglutide.
  - De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen. Lees hiervoor de folder 'voorbereiding op uw operatie' goed door.
  - De ochtend van de operatie mag u geen bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken.
  - Als u in de ochtend langwerkende insuline gebruikt (zoals Lantus, Levemir, Insulatard, Humuline NPH of Insuman Basal), dan moet u  $\frac{3}{4}$  van uw eigen dosering spuiten.
  - Als u in de ochtend kortwerkende insuline of een mix-insuline gebruikt, dan mag u geen insuline spuiten.
  - Bij een hypo-gevoel kunt u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.
  
- ❑ Patiënten die een insulinepomp gebruiken:
  - De avond voor de operatie kunt u wel eten en wel uw insulinepomp gebruiken.
  - De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen. Lees hiervoor de folder 'voorbereiding op uw operatie' goed door.
  - Op de ochtend van de operatie moet u de basisstand van de insulinepomp halveren.
  - Bij een hypo-gevoel mag u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

In het ziekenhuis wordt het bloedsuikergehalte regelmatig gemeten. Als het nodig is krijgt u een infuus met glucose en insuline aangesloten.

## **Vragen**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u maandag tot vrijdag tussen 8.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur telefonisch contact opnemen met de Preoperatieve screening.

Franciscus Gasthuis (Rotterdam): 010 – 461 6410

Franciscus Vlietland (Schiedam): 010 – 893 1960

*Maart 2024*

*1153*