

**INFORMATIE OVER AZATHIOPRINE
(IMURAN®)**

FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

Uw Maag-, Darm- en Leverarts of internist heeft u een ziekteremmend medicijn voorgeschreven voor de behandeling van uw chronische darmontsteking. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Lees daarom behalve deze folder ook de bijsluiter van de apotheek.

Effect van azathioprine

Met medicijnen is de oorzaak van chronische darmontsteking niet weg te nemen. Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger kunnen maken. Na enige tijd kunnen hierdoor uw darmklachten afnemen. Azathioprine is zo'n medicijn. Het kan twee tot vier maanden duren voordat u merkt dat dit medicijn begint te werken. Indien azathioprine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Helaas is dit niet bij iedereen het geval. Als het bij u niet werkt of als u te veel last hebt van bijwerkingen, kan uw arts besluiten het gebruik van azathioprine stop te zetten. Azathioprine wordt behalve bij chronische darmontstekingen ook gebruikt bij mensen met een reumatische aandoening en die een orgaantransplantatie hebben ondergaan.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kunt u azathioprine in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Als u azathioprine gebruikt samen met allopurinol (bij jicht), zal uw mdl-arts de dosering van azathioprine verminderen. **Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt.**

Wijze van innemen

Azathioprine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 25 en 50 mg. u kunt de tabletten doorslikken met voedsel, water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel inslikt. Als u tabletten vergeten heeft in te nemen, neem deze dan nog dezelfde dag op een later tijdstip in.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van azathioprine vermeld die ooit zijn voorgekomen zoals o.a.:

- Maag- en darmklachten zoals een verminderde eetlust, een vol gevoel, misselijkheid en braken, of diarree.
- Huiduitslag.
- Een alvleesklierontsteking: komt zelden voor, de klachten bestaan uit hevige pijn in de bovenbuik.
- Remming van uw bloedaanmaak, waardoor een tekort aan witte bloedcellen en/of bloedplaatjes kan ontstaan met hierbij het risico op ernstig verlopende infecties en/of bloedingen.
- Leverfunctiestoornissen: hier merkt u niets van. Wel kan dit worden aangetoond bij bloedonderzoek.

Neem direct contact op met uw huisarts, internist of mdl-arts bij:

- Overgevoeligheidsreacties zoals koorts, koude rillingen, spierpijn of een gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht).
- Forse bovenbuikpijn.
- Erge keelpijn in combinatie met koorts, regelmatig een bloedneus en snel blauwe plekken krijgen (allemaal tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak).

Als u last hebt van bijwerkingen, kunt u stoppen met het gebruik van azathioprine. Noteer dan wel op welke dag u bent gestopt en waarom. Neem bij twijfel contact op met uw arts.

Controles

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever en in de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, onderzoekt uw behandelde arts regelmatig uw bloed. Dit gebeurt de eerste periode meestal elke twee weken. Hierna vinden de controles minder vaak plaats.

Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mag azathioprine alleen gebruikt worden na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen. Het is erg belangrijk om uw behandelend arts te informeren als u een zwangerschap overweegt of al zwanger bent. Azathioprine kan namelijk in een enkel geval afwijkingen bij het ongeborn kind veroorzaken. Zowel vrouwen als mannen moeten ruim drie maanden voor een eventuele zwangerschap stoppen met het gebruik van azathioprine. Het is dus erg belangrijk om tijdens deze periode en tijdens het gebruik van azathioprine een betrouwbaar anticonceptiemiddel te gebruiken. U kunt beter geen azathioprine gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn wordt namelijk in de moedermelk uitgescheiden.

Aanvullende informatie

Als u veel last hebt van misselijkheid en braken, neem de tabletten dan in vóór het slapen gaan. Meestal hebt u dan minder last van deze bijwerkingen.

- Wees voorzichtig met alcoholgebruik. In combinatie met het gebruik van azathioprine is de kans groter dat u stoornissen krijgt in de werking van de lever. Neem daarom niet meer dan één alcoholconsumptie per dag.
- Bewaar geneesmiddelen altijd zó dat kinderen er niet bij kunnen.
- Als u tabletten overhoudt, lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd.
- Houdt u aan de afspraken voor bloedonderzoek.

Vragen

Als u nog vragen hebt, neem dan gerust contact op met uw internist of mdl-arts. U kunt hiervoor het beste een (telefonische) afspraak maken via het afsprakenbureau via telefoon 010 - 893 0000.