

PLAATSELIJKE VERDOVING VAN DE BORST

MAMMAFIELD BLOCK

Inleiding

Tijdens het gesprek ter voorbereiding op uw operatie heeft de chirurg of anesthesioloog voorgesteld om tijdens de operatie de borst plaatselijk te verdoven. Dit wordt ook wel 'mammapolde blok' genoemd. In deze folder leest u wat dit inhoudt.

Het gevoel in de borst wordt mogelijk gemaakt door zenuwen die onder en in de huid richting uw borst lopen. Deze zenuwen kunnen door middel van een plaatselijke verdoving tijdelijk worden uitgeschakeld. Dit gebeurt door middel van een injectie met een verdovingsmiddel op drie plaatsen rondom de borst.

Werkwijze

Op de dag van de operatie wordt u opgenomen op een verpleegafdeling. Van daaruit gaat u eerst naar de voorbereidingsruimte (de holding) van de operatieafdeling. Voor de veiligheid krijgt u daar een infuus en wordt u aangesloten aan een bewakingsmonitor.

Daarna gaat u richting de operatiekamer, waar u onder algehele verdoving (narcose) wordt gebracht. Het mammapolde blok (de plaatselijke verdoving) wordt pas toegediend als u onder narcose bent. Hier voelt u dus niets van.

Met behulp van een injectienaald wordt op drie plaatsen rond de borst een verdovingsmiddel ingespoten, waardoor de zenuwen die richting de borst lopen tijdelijk verdoofd (geblokkeerd) worden.

Voordelen

Het mammapolde blok heeft twee belangrijke voordelen:

- Extra pijnstilling tijdens en na de operatie.
- Minder misselijkheid na de operatie doordat tijdens en na de operatie minder aanvullende pijnstillers nodig zijn.

Deze vorm van verdoving kan (bijna) altijd worden toegediend. Bijvoorbeeld ook bij een slechte toestand van uw hart of bloedvaten of bij het gebruik van bloedverdunners.

Nadelen

De plaatselijke verdoving heeft twee nadelen:

- Er bestaat een kleine kans dat de verdoving niet voldoende werkt. De anesthesioloog en de anesthesiemedewerker merken dit dan tijdens de operatie en reageren hier direct op. U krijgt dan andere pijnstillers en ook medicijnen tegen de misselijkheid toegediend.
- Er bestaat een zeer kleine kans op beschadiging van de bloedvaten of zenuwen op de plaats van de injectie. Ook is er een hele kleine kans op een beschadiging van het longvlies. Hierdoor kan een klaplong ontstaan. Als dit gebeurt wordt er tijdelijk een drain in de long geplaatst.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft over de verdoving, dan kunt u van maandag tot vrijdag tussen 8.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de Preoperatieve screening.

- Franciscus Gasthuis (Rotterdam): 010 – 461 6410
- Franciscus Vlietland (Schiedam): 010 – 893 1960