

LONGFUNCTIEONDERZOEK

Medicatieverdunningsreeks

Wat is een longfunctieonderzoek?

Met een longfunctieonderzoek controleren we hoe uw longen en luchtwegen werken. Er zijn verschillende soorten onderzoeken. In deze folder leest u welk onderzoek u krijgt en hoe dit onderzoek verloopt. Het is ook mogelijk dat u meerdere onderzoeken krijgt.

Medicatieverdunningsreeks

Bij dit onderzoek bekijkt de longfunctieanalist of u voor één of meer specifieke medicijnen allergisch bent.

Op de binnenzijde van beide armen wordt een druppel aangebracht van de testvloeistof(fen) in sterk verdunde vorm. In de druppels wordt een klein prikje gegeven, zodat de vloeistof opgenomen wordt in de huid. Na 15 minuten wordt gekeken of er een bultje is ontstaan.

Hierna krijgt u dezelfde vloeistof(fen) op uw arm in een minder sterk verdunde vorm toegediend en wordt bovenstaande procedure herhaald. In totaal worden vijf sterktes getest op deze manier. Het onderzoek duurt maximaal 120 minuten.

Vorbereiding

Wij vragen u om op de dag van het onderzoek niet te zwaar in te spannen. Als u rookt dan vragen wij u om dit ongeveer 1 uur voor uw afspraak niet te doen.

Smeer op de dag van het onderzoek geen zalf op uw armen, dit kan de test beïnvloeden.

We raden u aan om 15 minuten eerder naar uw afspraak te komen, als u meer ontspannen het onderzoek in wil gaan.

Heeft u pas via uw huisarts een prednison- en/of antibioticakuur gekregen? Neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde om te vragen of het onderzoek door kan gaan. Bent u zwanger? Dan kan dit onderzoek niet doorgaan.

Medicijnen

Voor het onderzoek is het van belang dat u het gebruik van alle allergiemedicatie 72 uur van tevoren staakt.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde via telefoonnummer 010 – 461 6800.

Oktober 2022