

franciscus

KENACORT INJECTIE

Inleiding

Samen met uw behandelend orthopedisch chirurg heeft u besloten om u te laten behandelen met Kenacort injecties (cortison). In deze folder geven wij u informatie over de Kenacort injecties.

Wat is Kenacort?

Een kenacort injectie is een inspuiting van 2 stoffen (een glucocorticoid en ropivacaine of lidocaine). Deze injectie zorgt ervoor dat de ontstekingsreacties in de weefsels worden onderdrukt. Hierdoor zal zowel de pijn als de zwelling afnemen of zelfs helemaal verdwijnen.

De toedieningsvorm

De injectie kan op verschillende plekken worden gegeven, namelijk:

- In het betreffende gewricht;
- In een slijmbeurs;
- De nabij aangedane pezen en banden.

Het effect

Het verdovingsmiddel werkt meestal gelijk. Dit houdt een paar uur aan. Het effect van de Kenacort merkt u vaak na 2 a 3 dagen. Soms duurt het enkele weken. De duur van dit effect varieert van enkele weken tot maanden. In sommige gevallen zelfs langer. Een enkele keer is er geen effect.

Mogelijke bijwerkingen

Net als bij iedere behandeling heeft ook deze behandeling een aantal mogelijke bijwerkingen. Lees de bijwerkingen goed door:

- Na de injectie kunnen uw pijnklachten tijdelijk verergeren. Dit is vaak in de eerste periode na de injectie.
- Er kan een zwelling ontstaan op de plek waar de injectie is gezet. Ook kan de plek wat warm aanvoelen. Gebruik hiervoor een paracetamol en/of een ice-peak.
- Lokale huidafwijkingen kunnen stugger of dunner worden (kuiltje). Ook kan de huid verkleuren (witte vlek).
- Het kan zijn dat uw gezicht wat roder kleurt. Dit is tijdelijk en verdwijnt na een paar dagen.

- U kunt last krijgen van hormonale schommelingen. Hierdoor kunnen menstruatiestoornissen optreden. De menstruatie kan wat eerder komen, heviger en/of langduriger zijn. Bij vrouwen die in de overgang zitten, kunnen er in de eerste weken na de injectie bloedverlies optreden.
- Er zou een allergische reactie kunnen optreden. Dit komt weinig voor.
- Kans op een bloeding of een infectie. Dit is een zeldzame complicatie en komt heel weinig voor.

Heeft u diabetes? Dan kan het zijn dat uw bloedsuikerspiegel wat ontregelt raakt. Het advies is om uw bloedsuikerspiegel in de eerste dagen na uw injectie wat regelmatig te controleren.

Heeft u last van koorts, warmte, roodheid, zwelling en/of pijn? Dan kan dit een teken zijn van een infectie. Neem direct contact op met onze polikliniek via 010 – 893 0000.

Heeft u vragen?

Bekijk voor meer informatie onze website www.franciscus.nl.

Bent u op zoek naar informatie over uw persoonlijke gegevens of afspraak? Bekijk dan eerst uw patiëntenportaal via www.mijnfranciscus.nl.

Heeft u vragen over uw medicijnen of een andere medische vraag? Stel deze via de berichtenservice aan de polikliniek via BeterDichtbij.

Wilt u een medewerker spreken? Dan kunt u bellen met het Franciscus Contact Centrum via telefoonnummer 010 - 893 0000.