



## **LONGFUNCTIEONDERZOEK**

---

### **Aanvraag via de huisarts**

#### **Wat is een longfunctieonderzoek?**

Met een longfunctieonderzoek controleren we hoe uw longen en luchtwegen werken. Er zijn verschillende soorten onderzoeken. In deze folder leest u welk onderzoek u krijgt en hoe dit onderzoek verloopt.

## **Spirometrie**

Voor deze test blaast u met uw mond krachtig door een apparaat. Hierbij zit er een knijper op uw neus. De oefeningen wordt een aantal keer herhaald.

Hierna krijgt u een medicijn dat de luchtwegen kan verwijden. Als dit medicijn na 10-15 minuten is ingewerkt, blaast u met uw mond krachtig door een apparaat. Ook deze oefeningen doen we een aantal keer.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

## **Vorbereiding**

Wij vragen u om op de dag van het onderzoek niet te zwaar in te spannen, zoals sporten.

Als u bekend bent met benauwdheid na inspanning, raden wij u aan om 15 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn. Zo kunt u nog even rustig bijkomen voor het onderzoek begint.

## **Inschrijven**

Bent u nog niet ingeschreven in ons ziekenhuis, of zijn uw gegevens gewijzigd? Loop dan vóór uw afspraak langs de inschrijfbalie.

## **Medicijnen**

Als u medicatie gebruikt voor uw luchtwegen moet u deze volgens onderstaand schema staken:

### **48 uur vóór het onderzoek stoppen met:**

<b>Merknaam</b>	<b>Naam van het medicijn</b>
Anoro	Umeclidinium + Vilanterol
Duaklir genuair	Aclidinium + Formoterol
Hirobriz	Indacaterol
Incruse	Umeclidinium
Onbrez	Indacaterol
Relvar	Vilanterol + Fluticasonfioraat
Seebri	Glycopyrronium
Spiolto	Tiotropium + Indacaterol
Spiriva	Tiotropium
Striverdi	Olodaterol
Tiotrus	Tiotropium
Tovanor	Glycopyrronium
Trelegy ellipta	Fluticason + Umeclidinium
Trimbow	Beclometason + Formoterol + Glycopyrronium
Ultibro	Indacaterol + Glycopyrronium
Xoterna	Indacaterol + Glycopyrronium

### **24 uur vóór het onderzoek stoppen met:**

<b>Merknaam</b>	<b>Naam van het medicijn</b>
Aerivio	Salmeterol + Fluticason
Airflusal	Salmeterol + Fluticason
Atimos	Formoterol
Bretaris genuair	Alcidinium
Bufoler	Formoterol + Budesonide
Busalair	Budesonide + Salmeterol
Duosp	Formoterol + Budesonide
Elkira genuair	Alcidinium
Flutiform	Formoterol + Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol + Beclometason
Oxis	Formoterol
Seretide	Salmeterol + Fluticason
Serevent	Salmeterol
Singulair	Montelukast
Symbicort	Formoterol + Budesonide

## **8 uur vóór het onderzoek stoppen met:**

<b>Merknaam</b>	<b>Naam van het medicijn</b>
Airomir	Salbutamol
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Fenoterol + Ipratropium
Bricanyl	Terbutaline
Combivent	Salbutamol + Ipratropium
Ipramol	Salbutamol + Ipratropium
Ipraxa	Ipratropium
Salamol	Salbutamol
Ventolin	Salbutamol

Heeft u pas via uw huisarts een prednison- en/of antibioticakuur voor uw longen gekregen? Neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde om te vragen of het onderzoek door kan gaan.

Heeft u afgelopen 8 weken een operatie gehad aan uw oog, borstkas of buik? Neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde om het onderzoek te verplaatsen.

## **Uitslag**

Uw huisarts krijgt de uitslag van het onderzoek opgestuurd en bespreekt met u het resultaat.

## **Vragen?**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde via telefoonnummer 010 – 461 6800.

Kunt u niet op de afgesproken tijd komen, wilt u dan minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of verzetten?